

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ
ของประเทศไทยและทุกประเทศในโลก
เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบี
ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มักมีอาการไข้สูงและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
คนกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มักมีอาการรุนแรง
และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ผู้สูงอายุ และคนอ้วน
การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ
ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่นำมาใช้ในคนกลุ่มเสี่ยง
ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยที่มี
อาการของโรครุนแรง



วัคซีนไข้หวัดใหญ่...ความจำเป็น
สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

หญิงตั้งครรภ์
อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

เด็กเล็ก
อายุ 6 เดือน – อายุไม่เกิน 3 ปี



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานพยาบาล

คำเตือน: ห้ามฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หากเคยได้รับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้แบบรุนแรง

ทำไม



หญิงตั้งครรภ์
และเด็กเล็ก

ต้องฉีด

วัคซีน ไข้หวัดใหญ่



วัคซีนไขหวัดใหญ่

- วัคซีนไขหวัดใหญ่ช่วยป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ วัคซีนจะป้องกันโรคได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับว่าสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่มีการระบาดได้รับการบรรจุไว้ในวัคซีนที่มีใช้ขณะนั้นหรือไม่
- วัคซีนไขหวัดใหญ่มีความปลอดภัย พบอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนน้อยมาก
- วัคซีนไขหวัดใหญ่สามารถฉีดได้ในคนทุกวัย แต่ควรเน้นการฉีดเป็นประจำทุกปีในคนกลุ่มเสี่ยง

วัคซีนไขหวัดใหญ่จำเป็น
สำหรับหญิงตั้งครรภ์
และเด็กเล็ก

โรคไขหวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นไขหวัดใหญ่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

วัคซีนไขหวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์

- วัคซีนไขหวัดใหญ่ช่วยป้องกันไขหวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ และมีความปลอดภัยสูง นอกจากนั้นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนยังสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เด็กวัย 6 เดือนแรกป่วยเป็นโรคไขหวัดใหญ่
- แนะนำให้ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

ภูมิคุ้มกัน
จากแม่สู่ลูก

โรคไขหวัดใหญ่ในเด็กเล็ก

เด็กเล็กที่ป่วยเป็นไขหวัดใหญ่มักมีอาการไข้สูงซึ่งอาจเกิดอาการชักจากไข้สูง นอกจากนั้นยังพบภาวะแทรกซ้อนทางปอดได้บ่อย

วัคซีนไขหวัดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก

- วัคซีนไขหวัดใหญ่ช่วยป้องกันไขหวัดใหญ่ในเด็กเล็กและมีความปลอดภัยสูง
- แนะนำให้ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึงอายุไม่เกิน 3 ปี โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องฉีดสองครั้งห่างกัน 1 เดือน จากนั้นควรฉีดวัคซีนต่อไปปีละหนึ่งครั้ง