

# คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี 2566 – 2567

## ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

วัตถุประสงค์: เพื่อลดการป่วยรุนแรง/เสียชีวิต และรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ

หลักการให้วัคซีน\*: 1. วัคซีนทุกชนิด และทุกรุ่น สามารถนำมาฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้ ตามช่วงอายุที่ขึ้นทะเบียน

2. แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ก่อนถึงช่วงที่คาดว่าจะระบาด (ฤดูฝน)

\*ผลการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป พบว่ามีภูมิคุ้มกันร้อยละ 94 จากการติดเชื้อและรับวัคซีน (ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา)

กลุ่มเป้าหมาย	ไม่เคยมีประวัติการรับวัคซีน และไม่เคยติดเชื้อ	เคยมีประวัติการรับวัคซีน หรือเคยติดเชื้อ
<b>ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เสี่ยงสูงต่อป่วยรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ กลุ่ม 607 หญิงตั้งครรภ์<sup>3</sup> เด็กอายุ 6 เดือน<sup>4</sup> - 5 ปี</li> <li>เสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อ เช่น พนักงานบริการหรือผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสผู้คนเป็นจำนวนมาก หรือผู้อยู่ในสถานที่แออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า</li> </ul>	ฉีด 2 เข็ม ห่าง 1-2 เดือน <sup>5</sup> (primary series)	ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ต่อปี (booster) (กลุ่ม 607 อาจพิจารณาฉีด 2 เข็ม ต่อปี ห่างกัน 6 เดือน)
<b>เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม.</li> </ul>		
<b>ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีความเสี่ยงต่ำ</b>		ฉีด 1 เข็ม ต่อปี (ตามความสมัครใจ)

- หมายเหตุ
- กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการรับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อ (นอกเหนือจากกลุ่ม 607) แต่ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 2 เข็มต่อปี สามารถรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจ ภายใต้บริบทวัคซีนในแต่ละพื้นที่
  - คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคและข้อมูลทางวิชาการในอนาคต
  - สำหรับหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ คือ 12 – 20 สัปดาห์ (ทั้งนี้สามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภ์) แนะนำวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA (ตามข้อมูลการใช้ที่มีมากที่สุดในปัจจุบัน)
  - เด็กที่อายุ 6 เดือน - 1 ปี ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อมาก่อน แนะนำฉีดตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ฉีด primary series ตามการขึ้นทะเบียนของวัคซีนในอายุนั้นๆ (วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน แนะนำฉีด 3 เข็ม)
  - สามารถใช้วัคซีน Moderna (bivalent) และ Pfizer (bivalent) เป็น primary series ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป